


നിപ്പ (NIPAH)

പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ?

- തുടക്കത്തിൽ കാണുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ :
 - പനി
 - തലവേദന
 - പേശി വേദന
 - ഛർദ്ദി
 - തൊണ്ടവേദന
- തുടർന്ന് ഉണ്ടാകാവുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ :
 - തലകറക്കം
 - മയക്കം
- ചില ആളുകൾക്ക് ന്യൂമോണിയയും കടുത്ത ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളും അനുഭവപ്പെടാം.



പ്രതിരോധ മാർഗ്ഗങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ?

- നിപ്പ വൈറസ് ബാധിതരുമായുള്ള സമ്പർക്കം ഒഴിവാക്കണം.
- പഴങ്ങൾ നന്നായി കഴുകി തൊലി കളഞ്ഞ് കഴിക്കണം.
- വച്ചാലുകൾ കടിച്ചതിന്റെ ലക്ഷണമുള്ള പഴങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കണം.
- മൃഗങ്ങളെ പരിചരിച്ചശേഷം സോപ്പുപയോഗിച്ച് കൈകാലുകൾ നന്നായി കഴുകുക.
- മൃഗങ്ങളെ പാർപ്പിക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങൾക്കുള്ളിൽ വച്ചാലുകൾ കടക്കാതിരിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഒരുക്കുക.
- ജലസ്രോതസ്സുകൾ വിസർജ്ജ്യം വീഴാതെ മൂടി സംരക്ഷിക്കുക.
- ഫാമുകളിൽ അനാവശ്യ സന്ദർശകരെ ഒഴിവാക്കുക.
- പകർച്ചവ്യാധി ഉണ്ടെന്ന് സംശയിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, മൃഗങ്ങളുടെ പരിസരം ഉടൻടി ക്വാറന്റൈൻ ചെയ്യണം.
- പന്നി ഫാമുകൾ ഡിറ്റർജന്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പതിവായി വൃത്തിയാക്കുന്നതും അണുവിമുക്തമാക്കുന്നതും അണുബാധ തടയുന്നതിന് ഫലപ്രദമാണ്.
- രോഗം ബാധിച്ച/സംശയിക്കുന്ന പന്നികളുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നത് പരമാവധി ഒഴിവാക്കണം.
- രോഗബാധിതരായ മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലുന്നത് ആളുകളിലേക്ക് പകരാനുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം.
- പുതിയ പന്നിഫാമുകൾ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ , പ്രദേശത്തെ പഴംതീനി വച്ചാലുകളുടെ സാന്നിധ്യം പരിഗണിക്കുകയും പന്നിത്തീറ്റയും പന്നിപ്പുരയും വച്ചാലുകളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുകയും വേണം.
- വച്ചാലുകൾ കടിച്ച പഴങ്ങൾ മൃഗങ്ങൾക്ക് ആഹാരമായി നൽകരുത്.
- വച്ചാലുകളുടെ ആവാസവ്യവസ്ഥയിലേയ്ക്കുള്ള കടന്നുകയറ്റം (Eg. Deforestation) ഒഴിവാക്കുക.
- നിപ്പ വൈറസ് ബാധയിൽ പന്നികളും പഴംതീനി വച്ചാലുകളും ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ, വന്യജീവി / മൃഗങ്ങളുടെ ആരോഗ്യനിരീക്ഷണ സംവിധാനം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്.

